

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

12 Aout 1983

DLP 16-8-83218717



PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR et CORSE

(ALPES de HAUTE PROVENCE, HAUTES-ALPES, ALPES MARITIMES, BOUCHES-DU RHONE, HAUTE-CORSE, CORSE SUD, VAR, VAUCLUSE, SUD de la DROME)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Siège de la circonscription : 24, Rue Edouard Delanglade - 13006 MARSEILLE

Station d'Avertissements : Quartier Cantarel - MONTFAVET Adresse Postale : B.P. 95 84140 MONTFAVET - TELEPHONE : (90) 88.21.83

ABONNEMENT ANNUEL Bulletin GENERAL : 52 F - Bulletin TOMATE : 40 F - VITI-VAR : 40 F à Régis. recettes DDA, CCP Marseille 9660 74 V

SPECIAL CULTURE LEGUMIERE

L'OTIORRHYNQUE DU FRAISIER.

Depuis quelques années, ce charançon de couleur noire est responsable d'importants dégâts dans les fraiseraies du Vaucluse.

L'espèce en cause : *Otiorrhynchus meridionalis* Gyll n'est pas la même que dans les autres régions françaises touchées aussi par ce problème. Les dégâts sont pourtant semblables.

METHODES DE LUTTE :

Depuis 1979, le G.D.A. du Comtat, l'I.N.R.A. de Montfavet, et le S.P.V. de Montfavet ont entrepris des études visant à étudier la biologie et à mettre au point une méthode pour lutter contre ce ravageur.

Actuellement, aucune solution n'a été encore trouvée. Toutefois quelques orientations de lutte peuvent être données aux agriculteurs, sous réserve de confirmation des essais 83, et de l'homologation des produits à cet usage.


A) - Lutte contre les jeunes larves :

Application d'un microgranulé insecticide, à la plantation, ou en couverture aux environs du 20 Aout incorporée par une aspersion de 20 mm d'eau.

Il n'y a pas de produit homologué.



• Adulte sur feuille de cyclamen (8 à 10 mm).



• Dégâts d'adultes sur feuilles de lilas : encoches caractéristiques.

* Pulvérisation d'un insecticide. La protection doit débuter dès à présent et sera renouvelée tous les 15 Jours jusqu'au 15 Septembre.


Produit utilisable :

- Méthomyl (lannate - 3L P.C./ha) en pulvérisations sur la base de 1000 L/ha.

B) - Lutte contre les adultes :

Il est impossible de traiter les adultes à leur émergence. Toutefois, certains procédés évitent leur retour dans les fraiseraies.

- Gouttières remplies d'eau + teepol entourant le champ.
- Anneau de Lindane poudre ceinturant la parcelle.



• Larve (dernier stade : environ 10 mm) dans un rhizome de fraisier.

-----000-----